ASL ROMA 2
UOC COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VACCINALI
Protocollo ESTERNO in USCITA (documento inviato)
0251170/2022
30/12/2022 14:26:47

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 2

REGIONE LAZIO

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Coordinamento delle Attività Vaccinali
Direttore f.f.: dottor Giovanni Colaiocco
Via Monza, 2 - 00182 Roma Via Monza, 2 - 00182 Roma
tel. 06/5100.7606
e-mail: centri.vaccinali@aslroma2.it

Gentile Dirigente Scolastico,

è con piacere che Le trasmettiamo una lettera di invito alla vaccinazione per i nati degli anni dal 2007 al 2011 con la preghiera di diffusione tra i genitori degli alunni di codesto Istituto.

Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale in vigore sottolinea come l'adolescenza sia un momento molto importante per la somministrazione di richiami di vaccinazioni già effettuate nell'infanzia e per nuove vaccinazioni da effettuare elettivamente in questo periodo della vita.

Abbiamo, pertanto, scelto di offrire ai ragazzi la possibilità di vaccinarsi in accesso libero (nei Centri Vaccinali e nei giorni indicati per tutto il mese di gennaio) per effettuare le importantissime dosi raccomandate contro il Papillomavirus, contro i Meningococchi, contro lo Pneumococco e il richiamo obbligatorio anti-Difterite, Tetano, Pertosse e Polio. Nella comunicazione per i genitori vengono altresì riportate le indicazioni per eventuale prenotazione e brevi note sull'importanza di questi vaccini.

Auspichiamo che l'allegato possa essere diffuso attraverso il Registro Elettronico affinché abbia capillare visibilità.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

U.O.C. Coordinamento delle Attività Vaccinali
Il Direttore f.f.
Dott. Giovanni Colaiocco

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
ROMA 2

REGIONE
LAZIO

# INVITO ALLA VACCINAZIONE GRATUITA PER I NATI DAL 2007 AL 2011

## CONTRO IL PAPILLOMAVIRUS (HPV)

## CONTRO IL MENINGOCOCCO (CEPPI ACWY E CEPPO B)
## CONTRO LO PNEUMOCOCCO (PCV)
## CONTRO DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE-POLIO (DTPP)

AD ACCESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONE
presso qualsiasi Centro Vaccinale, nei giorni e negli orari indicati:

## DAL 9 AL 31 GENNAIO 2023

- **Centro Vaccinale Affile via Cerchiara 98** (IV Municipio)
  tutti i GIOVEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30
- **Centro Vaccinale via degli Eucalipti 14** (V Municipio)
  tutti i GIOVEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30
- **Centro Vaccinale via Telese 80** (V Municipio)
  nel giorno di SABATO 14 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 12.30
  nel giorno di MERCOLEDÌ 25 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 17.30
  nel giorno di VENERDÌ 27 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 17.30
- **Centro Vaccinale via Cambellotti 11** (VI Municipio)
  tutti i SABATO dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- **Centro Vaccinale via Monza 2** (VII Municipio)
  tutti i GIOVEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30
- **Centro Vaccinale via San Nemesio 21 presso CTO** (VIII Municipio)
  tutti i MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30
- **Centro Vaccinale via Silone 100** (IX Municipio)
  tutti i LUNEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30
- **Centro Vaccinale via Ardeatina 1227 (Centro della Gioia)** (IX Municipio)
  tutti i LUNEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.00
- **Centro Vaccinale via Frignani, 83 (Spinaceto)** (IX Municipio)
  tutti i LUNEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.00

È necessario presentarsi al Centro Vaccinale muniti di certificato vaccinale.

IN ALTERNATIVA È POSSIBILE PRENOTARE IN ALTRI GIORNI, IN ALTRI ORARI, IN TUTTI I CENTRI VACCINALI:

- accedendo on-line al sito http://www.aslroma2.it/index.php/promozione-alla-salute/vaccini
- inoltrando una richiesta via e-mail a vaccinazionihpv@aslroma2.it indicando dati anagrafici, sede e giorno di preferenza per la vaccinazione

## VI ASPETTIAMO!

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
ROMA 2

REGIONE
LAZIO

# PERCHÉ È IMPORTANTE VACCINARSI?

Il virus del HPV è responsabile del tumore al collo dell'utero nella donna, ma anche di numerosi altri tumori maligni genitali e orali maschili e femminili, nonché di condilomi e verruche genitali.
La vaccinazione contro il Papilloma virus può prevenire fino a quasi il 90% di tutti i tumori HPV-correlati; inoltre la vaccinazione è più efficace prima di una possibile trasmissione del virus che avviene per lo più per trasmissione sessuale. Il dodicesimo anno di vita è l'età indicata per la vaccinazione anti-HPV nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.

- **quante dosi servono?** La vaccinazione prevede un ciclo di due dosi nell'arco di circa 6/12 mesi entro i 14 anni. Dai 15 anni in poi servono 3 dosi. Il vaccino può essere co-somministrato con altri.

Il batterio del Meningococco rappresenta la principale causa nel mondo di meningite (infezione delle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale), ma può provocare anche una sepsi (infezione del sangue).
Non esiste un solo meningococco ma diversi tipi: i ceppi A, C, W135, Y sono la causa di circa il 30-50% delle forme di infezione per le fasce di età più a rischio (bambini, adolescenti e giovani) in Italia; il ceppo B di circa il 40-70% per le stesse fasce di età.
L'infezione può progredire molto rapidamente e diventare potenzialmente fatale nell'arco di 24-48 ore (nel 10-15% dei casi) o lasciare danni permanenti (10-20% dei casi).
La trasmissione avviene per via aerea e attualmente la vaccinazione rappresenta l'unica arma di prevenzione efficace.

- **quante dosi servono?** I vaccini da eseguire sono due. Per il vaccino associato contro 4 ceppi di meningite ACWY è sufficiente una dose. Per il vaccino diretto contro il ceppo B il ciclo prevede 2 dosi. I vaccini possono essere co-somministrati.

Il vaccino anti-Pneumococco previene le più comuni polmoniti batteriche ma anche, meningiti e sepsi (infezione del sangue). Le patologie pneumococciche si verificano durante tutto l'anno e sono più frequenti nei bambini non protetti e negli anziani. Il vaccino può essere co-somministrato con altri.

Il vaccino anti-Difterite, Tetano, Pertosse e Polio è la quinta dose di richiamo obbligatoria di una vaccinazione già effettuata nell'infanzia (tre esavalenti e richiamo dei 6 anni).
Il vaccino permette all'organismo di sviluppare le difese immunitarie in tutta sicurezza, proteggendoci contro malattie, che, altrimenti, potrebbero mettere a rischio la nostra salute e la nostra vita: il richiamo, durante l'adolescenza, è fondamentale per rafforzare la protezione immunitaria.
È importante altresì ripetere una dose di anti-Difterite, Tetano e Pertosse ogni 10 anni durante tutta la vita: si tratta di una vaccinazione prevista dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale e sempre gratuita. Il vaccino può essere co-somministrato con altri.

*Per info: centri.vaccinali@aslroma2.it*